

تقليم اشجار التين

اعداد
مديرية زراعة رام الله والبيرة
م. محمد الدرابيع
اشراف وتصميم
دائرة الإعلام الزراعي
م. أحمد الأسمر



الإدارة العامة للإرشاد والتنمية الريفية
وزارة الزراعة الفلسطينية

2021

موعد تقليم شجرة التين:

موعد تقليم التين الأساسي في نهاية الشتاء بعد انقضاء أوقات الصقيع ولكن قبل تفتح البراعم. ويمكن أن يتم التقليم بنهاية الصيف بعد جني المحصول لأن الثمار يتم حملها على نموات الموسم الحالي

- طريقة تقليم التين حسب التربية الكأسية:

تقليم التربية الكأسية يقص الشجرة الفتية بعد زراعتها في الشتاء على ارتفاع من 60-100 سم من سطح الأرض، وثم في الشتاء التالي نختار 3-4 فروع قوية موزعة تقريباً بالتساوي حول جذع الشجرة، وبحيث لا تكون قد نشأت من نفس المستوى من الجذع، ونزيل بقية الفروع الأخرى. ونقصر الفروع المختارة بحيث يصبح طولها حوالي 50 سم.

وفي الشتاء التالي نختار 2-3 فرعا على كل فرع رئيسي لكي تصبح فروعاً ثانوية، ونقصرها لطول 40-50 سم، ونزيل الفروع الأخرى. وفي الشتاء الثالث نختار 2-3 فرع على كل فرع ثانوي ونزيل البقية. وبالتالي سيصبح لدينا شجرة لها جذع واحد ومنه ينشأ 3-4 فروع رئيسية، ومن كل فرع رئيسي ينشأ 2-3 فرع ثانوي، ومن كل فرع ثانوي ينشأ 3-4 فرع ثالثي.

وثم نتبع خطوات تقليم شجرة التين العامة وهي:

أ- إزالة السرطانات:

ب- إزالة الأفرخ المائية:

ج - قطع الأغصان المتصالبة والكثيفة

د - قطع الأغصان المتدلية للأسفل:

هـ - قص الأغصان المريضة والمكسورة والميتة:

و - فتح مركز الشجرة:

ز- تقصير طول الشجرة:

من الأهداف الرئيسية لتقليم التين هو التحكم بحجم وطول الشجرة، لذلك علينا عدم السماح للشجرة ان تصبح طويلة لأنه سيكون من الصعوبة جني الثمار وتقديم الخدمات الزراعية للأغصان العالية. لذلك نقصر الافرع العالية بقطعه إلى أقرب فرع جانبي.



لاحتياج شجرة التين للتقليم لكي تثمر، ولكن تحتاج لتقليم خفيف فقط، لإعادة تنظيم وترتيب الأغصان ولكي نتحكم بحجم وارتفاع الشجرة. وكقاعدة عامة بتقليم الأشجار، وقبل البدء بتقليم أي شجرة ومنها شجرة التين يجب أن نعرف نظام تربية الشجرة، أي الهيكل الرئيسي للشجرة لكي نحافظ عليه، ويجب أن نعرف أيضاً طريقة حمل الثمار على الأغصان، أي ما هي الأغصان التي ستحمل ثمار لكي نحافظ عليها ولا نقلعها، وأي الأغصان لن تحمل ثمار التي يمكن أن نقلعها.

طريقة حمل ثمار التين:

يتم حمل الثمار على إبط أوراق الأغصان التي نشأت حديثاً في الربيع الحالي، وهو الموسم الرئيسي لثمار التين بالصيف.

ويمكن أن يتم حمل آخر لثمار التين في بعض أصناف التين على نهايات خشب العام الماضي أيضاً، ويكون كميته قليلة، وهو المحصول الربيعي لبعض أنواع شجر التين التي تحمل موسمين في الربيع وفي الصيف.

نظام التربية في التين :

نظام التربية الكأسية :

يتألف هذا النظام من جذع شجرة واحد قصير بطول متر تقريباً، ومن الجذع ينشأ 3 أو 4 فروع رئيسية موزعة بالتساوي على محيط الشجرة، وبحيث تكون المسافة بين الفرع والآخر حوالي 5-10 سم، وبحيث تتجه الفروع للأعلى ولكن ليس بشكل عمودي