



ارشادات وزارة الزراعة لتفادي الأضرار الناجمة عن السيول
والرياح الشديدة

في قطاع الانتاج النباتي والحيواني

الثروة السمكية

1

- ❖ تسويق الاسماك ذات الاوزان الكبيرة والإبقاء على الفراخ الصغيرة والبدء بتحضيرها لفصل الشتاء للحفاظ عليها للموسم القادم
- ❖ التوقف عن تقديم الاعلاف للاسماك
- ❖ التأكد من ان نقاط الكهرباء والامانات الرئيسية محمية من الامطار.
- ❖ مراقبة الفحوصات الدورية للمياة في حال وصول مياه الامطار الى البرك المكشوفة.



الخضار المحمية والمكشوفة

2

- ❖ اغلاق البيت المحمي وقت الظهيرة لتخزين اكبر كمية من الحرارة في الليل مع ضرورة التهوية صباحا لمنع زيادة الرطوبة.
- ❖ في حالة الرياح الشديدة عدم اغلاق البيت المحمي بشكل كامل وفتحه من الجهة المقابلة للرياح مع ترحيف النباتات خاصة البندورة لتخفيف الضغط على هيكل البيت المحمي.
- ❖ الرش الوقائي بعد المنخفضات بالمبيدات المسموح بها والمرخصة من وزارة الزراعة للوقاية من الامراض خاصة في البندورة والخيار والبطاطا.



ارشادات عامة

7

- ❖ ضرورة صيانة البيوت المحمية وحظائر التربية ووبرك تربية الاسماك والتأكد من ثباتها سلامتها من أي تمزق او ثقوب حتى لا تكون مدخل لمياه الامطار وبالتالي انتشار الامراض.
- ❖ التأكد من عدم وجود ما يعيق مجاري المياه في المنحدرات والمناطق المنخفضة والقريبة من الاودية.
- ❖ فتح القنوات حول المزارع و حظائر التربية لتصريف مياه الامطار وتنظيف مصافي آبار الجمع.



اعداد
م. ضحى عابدي

تصميم
م.احمد الأسمر

دائرة الاعلام الزراعي
الادارة العامة للارشاد
والتنمية الريفيه



وزارة الزراعة الفلسطينية

2022

مع تمنيات وزارة الزراعة الفلسطينية للسلامة للمزارعين وعوائلهم وازراقتهم
مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة التي يوجهاها الدفاع المدني من اجل سلامتهم

النحل

3



- ❖ وضع خلايا النحل في موقع مناسب (تحت الاشجار، تحت مظلات...) بعيدا عن مجاري الوديان والسيول
- ❖ إغلاق مدخل الخلية او تضيقه لمنع دخول الهواء والأمطار الى داخل الخلية على أن يكون مدخل الخلية بالاتجاه الشرقي الجنوبي.
- ❖ وضع كيس من الخيش تحت غطاء الخلية لمنع تسرب التيارات الهوائية الباردة .
- ❖ وضع ثقل على غطاء الخلية لضمان عدم طيران الغطاء بسبب الرياح .
- ❖ وضع خلايا النحل على الارتفاع الشتوي ورفع القوائم الخلفية لكرسي الخلية بحيث يميل للامام لمنع دخول المياه على مدخل الخلية وبهدف تقليل الرطوبة.
- ❖ رفع الاطارات الشمعية الزائدة بهدف تعقيمها وتخزينها، واستبدال مكانها بالقش لمنع حدوث تيارات هوائية بالخلية .
- ❖ اذا حدثت موجات البرد القارس في فترة الفيض فانه يتوجب على النحال اعطاء نصف لتر محلول سكري ١:١ بغرض تغذية النحل في حال امتناع النحل عن السروح للمحافظة على كميات العسل الموجودة داخل الاطارات.

الدواجن

5



- ❖ إغلاق البيت المحمي وقت الظهيرة لتخزين اكبر كمية من الحرارة في الليل مع ضرورة التهوية صباحا لمنع زيادة الرطوبة.
- ❖ في حالة الرياح الشديدة عدم اغلاق البيت المحمي بشكل كامل وفتحه من الجهة المقابلة للرياح مع ترحيف النباتات خاصة البندورة لتخفيف الضغط على هيكل البيت المحمي.
- ❖ الرش الوقائي بعد المنخفضات بالمبيدات المسموح بها والمرخصة من وزارة الزراعة للوقاية من الامراض خاصة في البندورة والخيار والبطاطا.

الاغنام والماعز

6



- ❖ عدم اغلاق الحظائر بشكل محكم وضمان تهويه مناسبة وجيده لمنع تكاثف ونزول الغازات المتصاعدة بشكل قطرات على القطيع.
- ❖ الاهتمام بالامهات في الاشهر الاخيرة من الحمل وتغذيتها بالعلائق المتوازنة تجنباً لحدوث الاجهاضات وتسمم الحمل.
- ❖ عدم تعريض المواليد الحديثة للتيارات الهوائية الباردة والحرص على تجفيف جسمها بعد الولادة واعطاءها حليب اللبا مع الحفاظ على جفاف الارضية وإعطاء طعم التسمم المعوي.

البستنة الشجرية و الزيتون

4



- ❖ حراثة البساتين بعكس ميل الارض مع اضافة الاسمدة العضوية.
- ❖ تقليم اشجار الزيتون بعد هطول ٦٠ الى ٨٠ ملم من الامطار.
- ❖ في الغراس المزروعة حديثا ضرورة تثبيتها ولف منطقة التطعيم بالخيش او الكرتون العازل