

# تغذية الاغنام

في الفترة الاخيرة من الحمل

اعداد  
مديرية زراعة رام الله والبييرة  
م. أحمد اليوم  
اشراف وتصميم  
دائرة الإعلام الزراعي  
م. أحمد الأسمر



في هذه المرحلة لا بد من ادخال علف مركز 14٪ بروتين او 16٪ بكمية معقولة لا تقل عن 1 كغم حسب وزن النعجة وحملها وعمرها اضافة قش نوعية جيدة كقش البيقا بشكل حر لتفادي المشاكل المترتبة على سوء التغذية .

الثنايا او الجدعات الحاملة (التي تحمل لأول مرة) يجب تقديم علف مركز (حبوب اوخلطة بروتين ) وعلف مالئ (قش او اتبان ) بكمية اكثر من الاغنام الناضجة لانها ما زالت تنمو .



الإدارة العامة للإرشاد والتنمية الريفية  
وزارة الزراعة الفلسطينية

2021

## ما الذي سيحدث عند سوء التغذية في آخر فترة من الحمل ؟ :

- 1) تأخر ادرار الحليب .
- 2) انخفاض انتاج اللبأ والحليب ايضا .
- 3) وزن ضعيف للحملان عند الولادة .
- 4) نسبة نفوق عالية للحملان والجديان بسبب الجوع .
- 5) وزن منخفض للحملان والجديان عند الفطام وبالتالي لا تصلح للتسمين.
- 6) نقص الطاقة في الغذاء المقدم للنعاج او الماعز التي تحمل توأم فاكثر يزيد من احتمالية اصابتها بمرض تسمم الحمل .

تمثل هذه المرحلة اخر ستة اسابيع من الحمل .  
نمو الجنين يكون سريعاً في هذه المرحلة حيث  
يتكون حوالي 70% من وزنه.  
المتطلبات الغذائية خلال هذه المرحلة تكون عالية  
للسبب التالية :



## الوقاية من اصابة الاغنام بتسمم الحمل :

- 1) زيادة كمية الشعير او الذرة المقدمة للاغنام في الفترة الاخيرة من الحمل .
- 2) اضافة مصدر للطاقة في العلف او في الماء كالدبس او العسل .
- 3) تعويد الاغنام الحوامل في هذه الفترة على الحركة والحيوية .

1-

معظم وزن المولود يتكون في هذه المرحلة .

2-

هناك حاجة للعناصر الغذائية اللازمة لتطوير الضرع بشكل كافٍ .

3-

هناك حاجة للعناصر الغذائية لانتاج كمية من حليب (اللبا) عند الولادة .

4-

هناك حاجة من العناصر الغذائية لتغطية المتطلبات الحافظة.